

PREOPANC-2

Neoadjuvant FOLFIRINOX vs. chemoradiotherapie en adjuvant Gemcitabine voor (borderline) resectabel pancreascarcinoom

INCLUSIE / EXCLUSIE CRITERIA

(Borderline) Resectabel Pancreascarcinoom

INCLUSIE CRITERIA

- PA-bewezen pancreascarcinoom
- (Borderline) resectabele tumor zonder metastasen
- WHO status 0 of 1
- Mogelijkheid om resectie en chemo(radio)therapie te kunnen ondergaan
- Leukocyten $\geq 3.0 \times 10^9/l$
- Trombocyten $\geq 100 \times 10^9/l$
- Hemoglobine ≥ 6 mmol/l
- eGFR ≥ 50 ml/min

EXCLUSIE CRITERIA

- Eerdere behandeling voor pancreascarcinoom
- Eerdere maligniteit (m.u.v. non-melanoma huidkanker, pNET <2cm, GIST <2cm), tenzij >3 jaar geleden en heden geen bewijs van ziekte, of levensverwachting >5 jaar.
- Zwangerschap
- Ernstige bijkomende systemische ziekte met invloed op veilig uitvoeren van de studie voor patiënt

INCLUSIE & RANDOMISATIE via

<https://aleaclinical.com/ErasmusMC/DM/>


DPCG definities resectabiliteit (DPCG, 2012)

	SMA	Celiac axis	CHA	SMV-PV
Resectabel (alle vier nodig)	Geen contact	Geen contact	Geen contact	$\leq 90^\circ$ contact
Borderline resectabel (≤ 1 nodig)	$\leq 90^\circ$ contact	$\leq 90^\circ$ contact	$\leq 90^\circ$ contact	90° - 270° contact zonder occlusie
Irresectabel (≤ 1 nodig)	$> 90^\circ$ contact	$> 90^\circ$ contact	$> 90^\circ$ contact	$> 270^\circ$ contact of met occlusie

PREOPANC-2

Neoadjuvant FOLFIRINOX vs. chemoradiotherapie en adjuvant Gemcitabine voor (borderline) resectabel pancreascarcinoom

SAMENVATTING (weken)



FOLLOW-UP (maanden)

	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
Poli	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
CT, CA 19-9, CEA	x		x		x		x		x		x		x		x
PROMs via PACAP	x	x	x	x	x		x		x		x		x		x

Vragen? Neem contact op!

Kiki Janssen: 010 7034519; 06 50032973

CTC trialbureau Erasmus MC:

q.janssen@erasmusmc.nl

preopanc2@erasmusmc.nl